

Behandlung der Varroose

zugelassene Bienenmedikamente und
integrierte Varroabekämpfung

Stand: August 2025

Tierarzneimittel zur Anwendung im brütenden Bienenvolk

Produkt	Wirkstoff	Apothekenpflicht	Anwendung	Dosierung
Ameisensäure 60% ad us. vet.	Ameisensäure 60%-ig	nein	im geeigneten Vakuum-Verdunster	80 ml pro besetzter Raum, tägliche Verdunstungsmenge nach Abschleuderung: 15-20 ml pro Tag über 5 Tage nach Auffütterung: 6-10 ml pro Tag über 10 Tage
Ameisensäure 60 Bernburg	Ameisensäure 684 mg/ml	nein	Geeignete Applikatoren Schwammtuch	12-20 ml pro Zarge und Tag über einen Zeitraum von 10 Tagen (40 Liter Zargenvolumen) 40 ml pro Zarge (4-5x im Abstand von 7 Tagen, 60 Liter Zargenvolumen)
Apiguard	Thymol 50 g	nein	Schälchen	2 Anwendungen im Abstand von 2 Wochen mit jeweils 50g Gel pro Bienenvolk
Thymovar	Thymol 15 g	nein	Streifen	2 Anwendungen im Abstand von 21-28 Tagen 2 Plättchen pro Brutraum
Apilife Var	Thymol 8 g Eucalyptusöl Campher Levomenthol	nein	Imprägnierte Streifen	4 Anwendungen im Abstand von 7 Tagen 1 Streifen pro Volk
Bayvarol	Flumethrin 90%ig 3,6 mg	ja	Streifen zum Einhängen	4 Streifen pro Volk über 40 Tage Vorsicht: Resistenzen !

Tierarzneimittel zur Anwendung im brütenden Bienenvolk

Produkt	Wirkstoff	Apothekenpflicht	Anwendung	Dosierung
VarroMed	Ameisensäure 75mg Oxalsäuredihydrat 660 mg	nein	Aufträufeln auf Bienen in Wabengassen bis zu 9x pro Jahr	je nach Volksstärke zwischen 15-45 ml
PolyVar Yellow	Flumethrin 275 mg	ja	Streifen vor dem Flugloch	Keine Angaben Vorsicht Resistenzen !
Apitraz	Amitraz 500 mg	ja, verschreibungspflichtig	Streifen zum Einhängen	2 Streifen pro Volk über 6 Wochen Vorsicht Resistenzen !
Apivar	Amitraz 500 mg	ja, verschreibungspflichtig	Streifen zum Einhängen	2 Streifen pro Volk über 6 Wochen Vorsicht Resistenzen !
Formic Pro	Ameisensäure 68,2 g	nein	Gel-Streifen	2 Streifen pro Volk über 7 Tage


Tierarzneimittel zur Anwendung im brutfreien Bienenvolk

Produkt	Wirkstoff	Apothekenpflicht	Anwendung	Dosierung
Milchsäure 15% ad us. vet.	Milchsäure 15%ig	nein	Lösung zum Sprühen 2x im Abstand von 1-5 Wochen Auch bei Ablegern und Kunstschwärmen	8 ml pro besetzte Wabenseite
Milchsäure Bernburg 150 mg/g	Milchsäure 16,67 g/100g	nein	Lösung zum Sprühen 2x im Abstand von 3 Tagen	8 ml pro besetzte Wabenseite
Oxalsäure- dihydrat- Lösung 3,5% ad us. vet.	Oxalsäuredihydrat 17,5 g in 500 ml gebrauchsfertiger Lösung	nein	Lösung zum Träufeln Einmalige Anwendung	je nach Volksstärke zwischen 30-50 ml insgesamt 5-6 ml pro besetzte Wabengasse
Oxalsäure Bernburg 40 mg/ml	Oxalsäuredihydrat 56 mg/ml Konzentrat	nein	Lösung zum A) Träufeln oder B) Sprühen	z.B. 3-4 ml pro besetzte Wabengasse (DNM) 2-3 ml pro besetzter Wabenseite (DNM)

Tierarzneimittel zur Anwendung im brutfreien Bienenvolk

Produkt	Wirkstoff	Apothekenpflicht	Anwendung	Dosierung
Oxuvar 5,7%	Oxalsäuredihydrat 57,4 mg/ml gebrauchsfertige Lösung 3,5%	nein	Lösung zum Träufeln Einmalige Anwendung, Zucker hinzufügen	je nach Volksstärke zwischen 30-50 ml insgesamt 5-6 ml pro besetzte Wabengasse
Oxuvar 5,7%	Oxalsäuredihydrat 57,4 mg/ml gebrauchsfertige Lösung 3,0%	nein	Lösung zum Sprühen Trinkwasser hinzufügen	Brutfreie Völker, Ableger und Schwärme: 2-4 ml pro Wabenseite oder 0,3 ml/dm ² besetzte Wabenfläche Schwärme, Kunstschwärme in Trauben: 20-25 ml pro kg Bienenmasse
Oxybee/ Bienenwohl	Oxalsäuredihydrat 39,4 mg/ml	nein	Lösung zum Träufeln	maximal 54 ml pro Volk 5-6 ml pro Wabengasse
Varroxal	Oxalsäure 0,71 g/g Pulver Oxalsäuredihydrat 1g/g Pulver	nein	Verdampfen: 2 g Verdampfungsgerät: Varrox oder Varrox Eddy Träufeln: 8 g / 200 ml Zuckerwasser (1:1) oder 12 g/ 200 ml Zuckerwasser (1:1) Sprühen: 6 g / 200 ml Wasser	Verdampfen: 2 g Träufeln: 3-4 ml pro besetzte Wabengasse Sprühen: 2-3 ml pro besetzte Wabenseite Schwärme, Kunstschwärme in Trauben: 20-25 ml pro kg Bienenmasse
Calistrip Biox	Oxalsäure 4,6 g (Oxalsäuredihydrat 6,44 g)	nein	Streifen zum Einhängen im brutfreien Volk oder bei auslaufender Brut Bienen müssen noch aktiv sein nicht in die Wintertraube einhängen	2 Streifen zwischen Futterwaben platzieren nach 6 Wochen entfernen

Integrierte Varroabekämpfung





Copyright: Bienenkunde

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Nevinghoff 40
48147 Münster

Email: imkerei@lwk.nrw.de
www.landwirtschaftskammer.de